

Minsk® 25 WG

Flazasulfuron (φλαζασουλφουρόν)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

061801a

Περιεχόμενο: **50** γρ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE Ltd., Ηνωμένο Βασίλειο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

 **BASF**
We create chemistry

Εγγυημένη σύνθεση: Flazasulfuron 25% β/β (χημική ομάδα σουλφονουρίες),
Βοηθητικές ουσίες 74.5% β/β.

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 70246/18-10-2017

ZIZANIOKTONO

 **ROTAM**

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από τον χώρο της έκθεσης.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 10 μέτρων σε αμπέλι και ελιά, 10 μέτρων με φυτική κάλυψη σε εσπεριδοειδή, 20 μέτρων με φυτική κάλυψη σε ακαλλιέργητες εκτάσεις.

Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 4%.

Σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε αμπέλι, ελιά, εσπεριδοειδή και ακαλλιέργητες εκτάσεις.

Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται μέσω της αποπλαστικής και συμπλαστικής οδού και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή με τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τις παραφυάδες ή μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκού-

πας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Ευαίσθητα Αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριοβρώμη, (*Avena fatua*, *Bromus sterilis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Ήρα (*Lolium* spp.), Πόα (*Poa annua*), Σετάριας (*Setaria verticillata*, *S. viridis*, *S. pumila*).

Ευαίσθητα Πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Καλέντουλα (*Calendula arvensis*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Κόνυζα (*Conyza/Erigeron canadensis*), Αγριοκαρότο (*Daucus carota*), Άγρια ρόκα (*Diplotaxis erucoides*), Καπνόχορτο (*Fumaria* spp.), Γεράνι (*Geranium dissectum*, *G. rotundifolium*), Λάμιο (*Lamium* sp.), Μολόχα (*Malva* sp.), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Στύφνος (*Solanum nigrum*), Αγριοράδικο (*Ta-*

raxacum officinale), Τριφύλλι (*Trifolium* spp.), Τσουκνίδα (*Urtica* spp.).

Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια: Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), Κύπερη (*Cyperus* spp.), Γαλασιίδα (*Euphorbia* spp.), Ζωχοί (*Sonchus arvensis*, *S. oleraceus*), Βερόνικα (*Veronica persica*).

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κιτριά): Συστήνεται 1 εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια ως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, την άνοιξη-καλοκαίρι, με **δόση** 16 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-40 λίτρα ανά στρέμμα.

Ελιά: Συστήνεται 1 εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη γραμ-

μή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια ως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το φθινόπωρο ως την άνοιξη, με **δόση** 16 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-40 λίτρα ανά στρέμμα.

Αμπέλι: Συστήνεται 1 εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια ως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο τέλος του χειμώνα ή τις αρχές της άνοιξης, με **δόση** 16 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-40 λίτρα ανά στρέμμα.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις (Σιδηρόδρομοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους

και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές): Συστήνεται 1 εφαρμογή προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, με δόση 20 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα ανά στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με προφυτρωτικές εφαρμογές.
2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων ή ως τα 10 εκ. ύψος.
3. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετι-

κέτα του σκευάσματος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα, κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Εσπεριδοειδή, Ελιά: 45 μέρες, Αμπέλι: 75 μέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέ-

χεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο (φιάλες, κουτιά) για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Minsk® 25 WG

Flazasulfuron (φλαζασουλφουρόν)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

061801a

Περιεχόμενο: **50** γρ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: ROTAM AGROCHEMICAL
EUROPE Ltd., Ηνωμένο Βασίλειο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 &
Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130,
www.basf-agro.gr

 **BASF**
We create chemistry

Εγγυημένη σύνθεση: Flazasulfuron 25% β/β (χημική ομάδα σουλφονουριές),
Βοηθητικές ουσίες 74.5% β/β.

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και
πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προ-
ϊόν. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. • Για να αποφύ-
γετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 70246/18-10-2017

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

 **ROTAM**

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



ΠΡΟΣΟΧΗ