

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΓΡΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΓΕΙΑΣ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΣΤΕ: Το CABADEX Extra δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ακαρίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών (χαμηλές η υψηλές θερμοκρασίες, η αδιάρρηση ή τον φυσαέδω).

Διαχείριση ανθεκτότητας: Το σκευάσμα περιέχει τη δραστική ουσία mesotrione, η οποία ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC και τη δραστική ουσία florasulam, η οποία ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC.

Το σκευάσμα περιέχει 2 δραστικές ουσίες, συνεπώς η ιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτότητας είναι πολύ μικρή.

Να εφαρμόζεται μηχανές ή καλλιεργητικές πρακτικές ελέγχου ζιζανίων (όπως έναλλαγμα καλλιεργειών, άρρωστη πριν τη σπόρα).

Να γραμματοποιείτε έναλλαγμα ζιζανιοτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΕΧΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- ΣΠΟΡΑΣΗ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΖΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΖΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιότονο, στο ίδιο χώρο μπορεί να ξανασταρεί οφειλότος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

- ΣΠΟΡΑΣΗ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Σε χώρο που εφαρμόστηκε το CABADEX Extra, μπορεί το φθινόπωρο να αποδρούν χειρεργικά σπιτά (απάριτη, κρήβαινο, τριπτικάλες, σικαλή). Επίσης ελαιοκάρπη, αφού προηγηθεί βαθιά δρόσιση κατεργασία.

* Σε χώρο που εφαρμόστηκε το CABADEX Extra, μπορεί την επόμενη άνοιξη να σπαρθούν: κτηνοτροφικά καλυμπούκια, καλαμπούκια, ανοιξιάτικα σπιτά (απάριτη και κρήβαινο). Επίσης ήλιανθος ή ελαιοκάρπη αφού προηγηθεί βαθιά δρόση και κατεργασία του εδάφους. Καιμά δάλη καλλιέργεια δεν μπορεί να σπαρθεί την επόμενη άνοιξη.

* Σε χώρο που εφαρμόστηκε το CABADEX Extra, μπορεί την επόμενη άνοιξη να σπαρθούν: την ουσιευτική απόσταση της μόλινης μέσων αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους).

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να φύσετε με τη γεωργική γη μέση ανέκαστη ζωνή ασφαλείας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη γρήγορη ακροφυτώντας μελωδής τη διασποράς του φεκαστικού νέφους κατά 75% ή μίαν αφεκτητή ζωνή ασφαλείας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυτών μελωδής της διασποράς του φεκαστικού νέφους κατά 50%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας έξιπλωνται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπογόνωμενα σε τρύπα, για τη διασφάλιση της μη πρεπτέρω χρήσης εναποθίνεται σε σημεία αυλογών, για ανακύκλωση ή ανάπτυξη ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική συμφωνημένη συσκευασία του, σε μέρος έγραψη και δροσερό, προστατευμένο από το ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Για τον αραβόσιτο μη εφαρμόσιμο έφαρμογή το αργότερό στα 6 ημέρα της καλλιέργειας (έως 30 Ιουνίου).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην αναπνέετε εκνεύφατα. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία και μέσα απομήκης προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα απομήκης προστασία για τα μάτια κατά την ανάμειξη/φόρωση/εφαρμογή του ουσιευτικού.

Να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την επανεισόδιο στην καλλιέργεια. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη συμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Έκθεσης ή θιανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδύνατεσία.

Σε περίπτωση κατόπτωσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό και δείξτε αμέσως το δοχείο, την ετικέτα.

Σε περίπτωση εποφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λεωμένα ρούχα και πλυνθείτε αμέσως με άθινο νερό και ασπρονί για 15-20 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Σε περίπτωση εποφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με άθινο νερό για 15-20 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί οι οποίας αφαιρέστηκαν, εθέσσονται εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Στείξτε αισθητικό συμβουλή.

Σε περίπτωση εισαγωγής: Μεταφέρετε το άπομο στον καθρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αποκρίνεται, ζητήστε αμέσως αισθητικό συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Ακολουθείτε θεραπευτικό συμπτωματικό.

ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210.77.93.777

Τηλ. Γραμμή Επικούρη Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, σκολοπισθήστε τις δόνησης χρήσης.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε ταν εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά νερά / Αποφύγετε τη μόλινη μέσων αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους).

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να φύσετε με τη γεωργική γη μέση ανέκαστη ζωνή ασφαλείας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη γρήγορη ακροφυτώντας μελωδής τη διασποράς του φεκαστικού νέφους κατά 75% ή μίαν αφεκτητη ζωνή ασφαλείας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυτών μελωδής της διασποράς του φεκαστικού νέφους κατά 50%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας έξιπλωνται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπογόνωμενα σε τρύπα, για τη διασφάλιση της μη πρεπτέρω χρήσης εναποθίνεται σε σημεία αυλογών, για ανακύκλωση ή ανάπτυξη ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική συμφωνημένη συσκευασία του, σε μέρος έγραψη και δροσερό, προστατευμένο από το ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Για τον αραβόσιτο μη εφαρμόσιμο έφαρμογή το αργότερό στα 6 ημέρα της καλλιέργειας (έως 30 Ιουνίου).

Ημερομηνία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας: Βλέπε συσκευασία

0123

**Cabadex®
EXTRA SC**

ZIZANIOKTONO

Εγγυημένη σύνθεση: Florasulam 1,67% β/ο
Mesotrione 26,7% β/ο
Βοηθ. συσίες 72,35% β/β

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Προφυτωτικό και μεταφυτωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• Υπόπτω την πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα οργανα (οφθαλμοί) ύστερα από παρατεμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Κάτοχος της Άδειας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρα 2 και Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2106889700

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70203/24-02-2017

Περιεχόμενο: 450 Κ.ΕΚ.

Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Προφυτωτικό και μεταφυτωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το ηλιαραλ σείνεται εναστάτωση των ζιζανίων στον αραβόσιτο. Προστασίει αναστάτωση των ζιζανίων. Ορατά συμπτώματα εμφανίζονται μέσω της επόμενης ημέρας μετά την εφαρμογή. Καταστροφή των ευαίσθητων ειδών επέρχεται μέσω της επόμενης 1 έως 8 εβδομάδες ανάλογα με τις καλλιεργητικές συνθήσεις. Το μεσοποιητικό ηλιαραλ σείνεται στη βιοσύνθεση των καρπούσιων με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

ΦΩΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Για την αντιμετώπιση των πλατύφυλλων ζιζανίων: Λουβούσιδι, Βλήτο τραχύ, Αγριούλειτζα, Αγριοτομάτι, Αγριοβαμβακί, Βλήτο πλαγαστό*, με Δόση: 45 Κ. ΕΚ. σκ./στρέμμα για Προφυτωτική εφαρμογή: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπόρα ήνως και το φυτώμα του αραβούσιου (από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου).

* Ήσε Δόση: 30 Κ. ΕΚ. σκ./στρέμμα για Μεταφυτωτική εφαρμογή: Από το στάδιο των 2 φύλλων έως το φύλλο πόλλα (από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου).

Ογκός Φεκαστικού υγρού: 30-40 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα ζιζανία Αγριοβαμβακιά και Βλήτο πλαγαστό καταπολεμούνται μόνο με τη μεταφυτωτική εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Προφυτωτική ή νωρίς μεταφυτωτική εφαρμογή, με ομοιόμορφο φεκασμό φύλλωματος, με 30-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακύπτετε τα δοχείο πριν την ερήμηση.
Γεμίστε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαντούμενη ποσότητα σκευασμάτων μέσα στο δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό σε συντομότερη δύναμη απροστατικού που αναδένονται.
Ανακύπτετε την πάρβη φεκασμού, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια. Αδειάστε τελείως το φεκαστικό. Γ) Επαναλάβετε την διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο Β. Δ) Τα ακροφύσια και τα φύτρα να καθαρίζονται έχοχριστα. Στη συνέχεια ξεπλύνετε το δοχείο, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε ίχνη του απροστατικού. Αδειάστε το δοχείο τελείως.

Για την απόρριψη των νερών του ξεπλύματος ακολουθήστε την κείμενη νομοθεσία. Μην τα ψεκάζετε σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε αγρούς που προορίζονται για την καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιέργειών.

250X90

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.