



Elatus® Era

syngenta®

**GROUP 7|3 FUNGICIDES**

**UFI: 8QFS-5537-T007-X51G**

Benzovindiflupyr (ομάδα Πυραζολοκαρβοξαμιδών)  
Prothioconazole (ομάδα Τριαζολινθιονών)

Γαλακτωματοποίησμο Υγρό (EC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΔΑ):  
60661/01.02.2018

**ΕΙΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Benzovindiflupyr: 7,5 % β/ο  
Prothioconazole: 15 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 76,86 % β/β

Μικροτοκτόνο με  
προστατευτική και  
θεραπευτική δράση  
στα κύρια παθογόνα  
των σιτηρών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για  
επαγγελματίες χρήστες.


**ΚΑΤΟΧΟΣ ΆΔΕΙΑΣ:**

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής,  
153 49, Τηλ.: 210 6666612-13

[www.syngenta.gr](http://www.syngenta.gr)

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος,  
Τηλ.: 231 0796940-3



- Μπορεί να προκαλέσει απλεγματική δέρματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**5 lt e**

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Πλένετε τον προστατευτικό εξοπλισμό μετά τη χρήση. • Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και γάντια. • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερυτικά κλειστός.

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθίσιμος του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέστε. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ MATIA:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθίσιμος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καθέστε το KΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση κατάσπονσης:** Καθέστε αμέσως γιατρό (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 7793777

**Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του.**

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να τηρήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 10 μέτρων σε συνδυασμό με φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων (VBS).

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Το Elatus Era είναι μικητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση στα κύρια παθογόνα των σιτηρών. Περιέχει τα δραστικά συστατικά Benzovindiflupyr και prothiocazole. Το Benzovindiflupyr είναι μικητοκτόνο νέας γενιάς SDHs της κυκλικής ομάδας των Πυραζόλοκαρβοξιμίδων. Το Benzovindiflupyr είναι κυρίως προστατευτικό μικητοκτόνο με κάποια περιορισμένη θεραπευτική δράση. Αποτελεί αναστολέα του ενύδρου αφύδρωνάτον του πλεκτρικού οέδειου του συμπλοκού II της αναπνοής που είναι απαραίτητο στο μιτοχονδριακό κύκλο με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα. Το prothiocazole είναι διασυστηματικό μικητοκτόνο της ομάδας των Τριαζολινθιονών. Σε βιοχημικό επίπεδο δρά παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης (SBL), η οποία είναι το κύριο συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών των μυκητών. Συγκεκριμένα το prothiocazole δρά στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors-DMIs). Το prothiocazole παρουσιάζει πολύ καλή διασυστηματική κίνηση στο φυτό μέσα των αγγείων του ξύπου (ακροπεταλική διασυστηματική κίνηση). Εμποδίζει την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα του μύκητα και την ανάπτυξη των μυκητιακών υφών. Η δράση του είναι κυρίως προθητική.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/ διαλύματος εφαρμογής:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού υπηκανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την αποτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

## Φάσμα δράσης:

**Σιτάρι, Ζέα (σπελτ, ντίνκελ):** για *Κίτρινη Σκωρίαση (Puccinia striiformis)*, *Καστανή Σκωρίαση (Puccinia recondita)*, *Σεπτορίωση (Septoria tritici)*, *Φουζαρίωση (Fusarium spp.)* με δόση 50-100 κ.εκ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος από το σχηματισμό του 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης (BBCH 31-69).

**Κριθάρι:** για *Εμινινθοσπορίωσην / Δικτυωτή κηπιδώσωση (Rygeophora teres)*, *Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis)*, *Ραμουλάρια (Ramularia collo-cygni)*, *Σκωρίαση (Puccinia hordei)* με δόση 50-100 κ.εκ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος από το σχηματισμό του 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της ξεσταχύσματος/ πλήρης έκπτυξη της ταξινομίας (BBCH 31-59).

**Βρώμη:** για *Σκωρίαση (Puccinia coronata)* με δόση 50-100 κ.εκ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος από το σχηματισμό του 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της ξεσταχύσματος/ πλήρης έκπτυξη της ταξινομίας (BBCH 31-59).

**Σίκαλη:** για *Καστανή Σκωρίαση (Puccinia recondita)*, *Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis)* με δόση 50-100 κ.εκ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος από το σχηματισμό του 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης (BBCH 31-69).

**Τριτικάλε:** για *Καστανή Σκωρίαση (Puccinia recondita)*, *Σεπτορίωση (Septoria tritici)*, *Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis)*, *Φουζαρίωση (Fusarium spp.)* με δόση 50-100 κ.εκ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος από το σχηματισμό του 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης (BBCH 31-69).

**Παραπτορίσεις:** για *Καστανή Σκωρίαση (Puccinia recondita)*, *Σεπτορίωση (Septoria tritici)*, *Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis)*, *Φουζαρίωση (Fusarium spp.)* με δόση 50 κ.εκ.σκ./στρέμμα) προϋποτικά ή σε περιπτώσεις που εμφανίζεται καμπυλής έντασης προσβολής.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

**Σιτάρι, Ζέα (σπελτ, ντίνκελ), Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτικάλε:** δεν ορίζεται (καλύπτεται από την καλλιεργητική περίοδο μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής).

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται ή να αποκλείεται:**

**Για την αποφυγή άναπτυξης ανθεκτικότητας:**

- Μην εφαρμόζετε το *ELATUS ERA* περισσότερο από 1 φορά ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Να χρησιμοποιείται σε προγράμματα φυτοπροστασίας με εναπλαγές σκευασμάτων διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Να εφαρμόζεται κυρίως προϋποτικά ή νωρίς θεραπευτικά.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργεία στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει.

**Φυτοτοξικότητα:** Το σκεύασμα *Elatus Era*, δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

**Συνδυαστικότητα:** ----

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν ποπώρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι κενές φάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτελούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος – Συνθήκες αποθήκευσης:** Αποθηκεύεται σε καλή αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται εργατικά κλειστός. Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

