

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Οι εργάτες κατά τον χειρισμό των επενδεδυμένων πατατόσπορων να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Αφαιρέστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος δράσης: Περιέχει Fludioxonil (χημική ομάδα φαινυλοπυρρολίων) το οποίο προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων και παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου.

Τρόπος εφαρμογής: Το INFLUX 100 FS εφαρμόζεται με την χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού, που μπορεί να είναι υψηλής πίεσης ακροφύσια πάνω από περιστρεφόμενους δίσκους ή τραπέζια με κυλινδρικούς ή ιμάντες μεταφοράς. Η εγκατάσταση τέτοιου επαγγελματικού εξοπλισμού μπορεί να γίνει και πάνω στο ειδικό μηχανήμα σποράς πατατόσπορου. Το INFLUX 100 FS εφαρμόζεται σαν υδατικό εναιώρημα. Ο απαιτούμενος όγκος του υγρού εφαρμογής διαφέρει ανάλογα την μέθοδο που χρησιμοποιείται. Θα πρέπει το μείγμα να ανακατεύεται πολύ καλά και να εφαρμόζεται την ημέρα παρασκευής του.

 **Influx® 100FS**

syngenta.

GROUP 12 FUNGICIDE

Fludioxonil
(χημική ομάδα φαινυλοπυρρολίων)

Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS)

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ):
60384/12-9-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Fludioxonil 10 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 90,26 % β/β

Προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής για επένδυση πατατόσπορου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

1 lt e

Product names marked © or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΣΟΧΗ



• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προσοχή για την ασφάλιση απόδοσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Οι επενδεδυμένοι πατατόσποροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.

Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων πατατόσπορων, δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του προστατευμένου από το άμεσο ηλιακό φως και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Πατάτα: Δεν έχει εφαρμογή.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πατάτα: Για *Rhizoctonia solani*, *Helminthosporium solani* 25 κ.εκ./100 κιλά πατατόσπορου-κονδύλιον. Όγκος νερού/100 κιλά πατατόσπορου-κονδύλιον * 1 εφαρμογή αμέσως πριν τη σπορά χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.

* Το INFLUX 100 FS εφαρμόζεται σαν υδατικό εναιώρημα. Ο απαιτούμενος όγκος του υγρού εφαρμογής διαφέρει ανάλογα την μέθοδο που χρησιμοποιείται:

1. **Κυλιόμενος ιμάντας σε θάλαμο ψεκασμού:** Όγκος εφαρμογής: 1 λίτρο ανά τόνο πατατόσπορου (250 κ.εκ. σκευάσματος + 750 κ.εκ. νερό). Το ψεκαστικό υγρό εφαρμόζεται από περιστρεφόμενο δίσκο στον πατατόσπορο που περνάει πάνω σε κυλιόμενο ιμάντα, μέσα σε θάλαμο ψεκασμού.

2. **Πάνω στην σπαρτική μηχανή:** Όγκος εφαρμογής: 2 λίτρα ανά τόνο πατατόσπορου (250 κ.εκ. σκευάσματος + 1750 κ.εκ. νερό). Η εφαρμογή στον πατατόσπορο γίνεται με ψεκασμό του πατατόσπορου μέσα στη σπαρτική μηχανή πριν αυτός τοποθετηθεί στο έδαφος.

