

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Να φοράτε γάντια κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος κατά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε το μολυσμένο ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφέστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένεται τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτρωτές επιφάνειες και τους δρόμους.

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων, μην εφαρμόζετε σε αλκαλικά εδάφη.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφεθεί:

• μια φυσική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή μια αψέκαστη ζώνη **20 μέτρων** συμπεριλαμβανομένης μιας φυσικής ζώνης ανάσχεσης **10 μέτρων** στην καλλιέργεια του αμπελιού.

• μια αψέκαστη ζώνη **50 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα ή μια αψέκαστη ζώνη **20 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **95%** στην καλλιέργεια της φυστικής.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το QUADRIS 25 SC είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με μερική διεσπαστική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Ελέγχει μύκητες που ανήκουν στους Ασκομύκητες, Βασιδιομύκητες, Δευτερομύκητες & Ζωμύκητες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψως με προσοχή να διαβραχούν καλά όλες οι επιφάνειες που κινδυνεύουν από προσβολή. Χρησιμοποιείτε λίγο νερό για τον ψεκασμό (μέχρι 120 λίτρα ανά στρέμμα και η ανάλογη ποσότητα νερού θα εξαρτάται από το μέγεθος της βλάστησης).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα ακευασμένου. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνετε τα ποτήρια φορές ριχνώντας το νερό στο ψεκαστικό.

Φυτοτοξικότητα: • Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στο αμπέλι. Μπορεί να παρατηρηθεί σε μερικές ποικιλίες ένα ελαφρό, διάχυτο κίτρινομα των φύλλων που βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Το σύμπτωμα αυτό, που παρατηρείται και φυσιολογικά είναι καμία φορά πιο έντονο μετά από ψεκασμό με Quadris 25 SC. Κρατάει λίγες ημέρες (περίπου μια εβδομάδα) και υποχωρεί μετά, χωρίς καμία συνέπεια για το αμπέλι. Δεν συντρέχει λόγος να τα λιπθώνον μέτρα αν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα (π.χ. διαφυλλική λίπανση κλπ.). • Το Quadris 25 SC είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. • Μην χρησιμοποιείτε για ψεκασμό μηλιές, ψεκαστικά μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί με Quadris 25 SC. • Μην χρησιμοποιείτε το Quadris 25 SC εάν υπάρχει πιθανότητα να φτάσει το ψεκαστικό νέφος σε γειτονική καλλιέργεια μηλιές.



Quadris®

25 SC

syngenta.

GROUP 11 FUNGICIDE

ΠΡΟΣΟΧΗ



Azoxystrobin (ομάδα Στρομηθουρινών)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60674/23.03.2018

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Azoxystrobin 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 76.5 % β/β

Προστατευτικό μυκητοκτόνο

με μερική διεσπαστική δράση

που παρεμποδίζει τη βλάστηση

των σπορίων, την ανάπτυξη

του μυκηλίου και την παραγωγή

των σπορίων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Λ. Ανθούσης, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 031 6796940-3

1 lt e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

Φάσμα δράσης: Αμπέλι (εντραπέζιο, ανοποιοποίηση): Στάχοι: Οίδιο (Uncinula necator), Περονόσπορος (Plasmopara viticola), Μούρη Στήψη (Guignardia bidwellii), Δάμωση (Phomopsis viticola). **Τρόπος & χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασμός Φυλλώματος. Από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου έως την έναρξη της ωρίμανσης (οι καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας τους) (BBCH 13-81). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες. **Δόσεις:** • 75^{ml} κ.ε.κ./στρέμμα ή 65-150^{ml} κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. • 100^{ml} κ.ε.κ./στρέμμα ή 85-200^{ml} κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. **Φιτοκίδια¹ (καλλιέργεια πύσσους σμυριάς):** Για Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria dothidea) με δόση 90 κ.ε.κ./στρέμμα με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός από το τέλος της άνθησης/την εμφάνιση του καρπιδιού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 69-85). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-21 ημερών.

Παρατηρήσεις:

- (1) Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα (75 κ.ε.κ./στρέμμα) ενώ όταν είναι υψηλή να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα (100 κ.ε.κ./στρέμμα).
- (2) Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (100 κ.ε.κ./στρέμμα).
- (3) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της φυστικής από τη χρήση του ακευασμένου. Για την χρήση του ακευασμένου στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι (εντραπέζιο, ανοποιοποίηση): Φιτοκίδια: 21 ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτολογικές ή περιβαλλοντικές, υπό τις οποίες το ακευασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίσσει: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: • Για το μύκητα Uncinula necator επιτρέπονται έως δύο διαδοχικές εφαρμογές με το Quadris 25 SC. • Για το μύκητα Plasmopara viticola επιτρέπεται μία εφαρμογή με το Quadris 25 SC ανά τρεις εφαρμογές. • Εφαρμόστε το Quadris 25 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτά των στρομηθουρινών (QoIs) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα. • Εφαρμόστε το Quadris 25 SC προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων:

- Να αποφευχθεί η μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες.
- Να μην χρησιμοποιείται το Quadris 25 SC σε αμπελώνες που γειτονιάζουν με καλλιέργεια μηλιές εφόσον υπάρχει πιθανότητα να φτάσει το ψεκαστικό νέφος στους οπαρώνες μηλιές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το ακευασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Συνδυαστικότητα: ----

Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μηχανήματος να εξοφλιούνται πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες, συσκευασίες ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξεπλύση (τα νερά του ξεπλύματος ριχνούνται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προφυγνόμεως με τρίψιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω δράσης, να εναποθεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του ακευαστού – Συνθήκες αποθήκευσης: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

L1080041 GREC/9Z PPE4146742