

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνεύσετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμού/ εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. • Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι προσεκτικά μετά το χειρισμό. • Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε ολόκληρη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το 24ωρο τηλεφωνο επειγούσας ανάγκης της Syngenta ή εάν απευθυνθείτε για θεραπεία.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα πετρελίου.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοδοτούρες επιφανείας και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους αφήστε μία ψέκαστη ζώνη προστασίας 2 μέτρων η χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.



Axial[®]
60 EC

syngenta.

GROUP 1 HERBICIDE

ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: U9H2-X05J-6005-AK9F

Pinoxaden (χημική ομάδα φαινυλοπυραζολίνες)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70055/29-07-2019

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Pinoxaden 6 % β/ο

(Clonquintocet –mexyl

σαν αντιφυτοξικό

παράγοντα 1,5 % β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 93,6 % β/β

(συμπεριλαμβανομένου

του αντιφυτοξικού παράγοντα)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E. Α. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49 Τηλ.: 210 666612-13 www.syngenta.gr ΘΕΣ/ΚΗ: Βί.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3



- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβryo.

1 lt e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

Τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων που απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιόσύνθεση των λιπαρών οξέων και την κυτταρική διαίρεση. Το ρινοxaδεν, ανήκει στη νέα χημική ομάδα των phenylpyrazolin που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμιου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιόσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός καθολικός ψεκασμός φυλλώματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου ακούρας. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε με νερό το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/2, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και μετά συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό, με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. Να γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.

Συνδυαστικότητα: ---

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται από πίσω ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλάσιο, για τη διασφάλιση των μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίσσει: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιτεργιακά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό, να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή εφαρμογή μη εκλεκτικών προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων και να γίνεται εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιτεργιών που ακολουθούν: Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στη διαδοχή των καλλιτεργιών στην αμειψισπορά κάτω από κανονικές συνθήκες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Χρονική σταθερότητα στο σκευάσμα - Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Στάρι (σκληρό / μαλακό), Κριθάρι, Σίκαλη: Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

Φάσμα δράσης: Στάρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι, Σίκαλη¹: για *Alopecurus* (*Al- percurus myosuroides*), *Ηρα* (*Lolium rigidum*²), *Lolium multiflorum*³, *Αγριοβρόμο* (*Avena sterilis*, *Avena fatua*), *Φάληρα* (*Phalaris paradoxa*, *Phalaris brachystachys*, *Phalaris minor*) 75 κ.εκ.οκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος από τα 5 φύλλα έως την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σπμια (IBVC 15-39).

Παρατηρήσεις: 1. Να εφαρμόζεται την Άνοιξη μόνο για χειμερινά σιτηρά. 2. Εφαρμόστε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που είναι προσηλωμένες ή είναι υπεραιωρούμενες από το κρού ή την θέρωση για να αποφευχθεί κλάση που μπορεί να μην είναι η βέλτιστη. 3. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στα ζιζάνια με ενεργή ανάπτυξη. 4. Στο είδος *Lolium rigidum* παρατηρείται μειωμένη αποτελεσματικότητα. 5. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στη σίκαλη. Πριν τη χρήση του στη σίκαλη να προηγείται η δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.