

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Τοποθετήστε τον ασθενή σε καλή αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερμία. Χορηγήστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην του προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τα συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για το καλαμπόκι και 5 μέτρων για άλλες καλλιέργειες από την μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μέσων: Πλύνετε καλά το ψεκαστικό μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυτίου με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της περιεκτικότητας του. Βάλτε το ψεκαστικό σε βετούργια. Αφού το αδειάσετε επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάστε το νερό καθαρισμού σε ακαθίστηργτο εδάφος μακριά από πηγές νερού.

Διακρίση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γεωτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες): Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από: • 5 μέτρα από υδάτινες επιφάνειες • 10 μέτρα από γεωτονικές καλλιέργειες ή φυτά για καλλιέργεια του καλαμπόκιου • 5 μέτρα από γεωτονικές καλλιέργειες ή φυτά για τις λοιπές καλλιέργειες. Στον ίδιο αγρό, να μην σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστάμενες, πριν περάσουν τουλάχιστον 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προληπτικώς με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση/καταστροφή του DUAL GOLD 96 EC πρέπει να γίνεται σε ψυκαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες με τις προτεινόμενες δόσοι/οδηγίες.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλή αεριζόμενο μακριά από ήλιο και υγρασία.

L1002734 GREC/10S PPE4043738



Dual Gold 96 EC®

syngenta®

S-metolachlor (S-μετολαχλώρ)

Γαλακτωματοποίηση υγρό (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

S-metolachlor 96% β/ο
βοηθητικές ουσίες 9,9 β/β

Αρ. οριστ. Εγκρ. κυκλ. Υπ. Γεωργίας:
7708/15-7-08

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών ηλατύφυλλων ζιζανίων στα ζαχαρότευτλα, αραβόσιτο, βαμβάκι, τομάτα, πατάτα, καπνό.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME & the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 ltr

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις.

Φάσμα δράσης:

Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα, Βαμβάκι, Τομάτα, Πατάτα, Καπνό: Ετήσια αγρωστώδη και μερικά ηλατύφυλλα ζιζάνια*. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 30-60.

Δόσεις σκευάσματος (κ.εκ.σκευάσμ./στρ.) και Τρόπος εφαρμογής: **Αραβόσιτος:** 100-160 προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά) 80-100 χωρίς μεταφυτρωτικά (στάδιο 2-4 φύλλων της καλλιέργειας).

Ζαχαρότευτλα: 80-130 προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά).

Βαμβάκι: 100-130 προφυτρωτικά(σύντομα μετά τη σπορά) 100 προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.)**. **Τομάτα:** 100-130 πριν τη μεταφύτευση της τομάτας. **Πατάτα:** 100-130 προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια. **Καπνός:** 100-130 πριν τη μεταφύτευση του καπνού.

***Ευαίσθητα ζιζάνια:** Μουχρίτσα (Echinochloa crusgalli), Αιματοχόρτο (Digitaria spp.), Σetaρία (Setaria spp.), Βλήτα (Amaranthus spp.), Αγριοτομάτι (Solanum nigrum), Γλυστορίδα (Portulaca oleracea), Ήρα (Lolium spp.), Καφέλα (Capsella bursa pastoris), Χαμομήλι (Matricaria spp.), Καπνόχορτο (Fumaria spp.).
Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus), Στελλάρια (Stellaria media), Λουβουδιά (Chenopodium album).

Παρατηρήσεις:

1. ** Στο βαμβάκι ,προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.), σε μη αρδευόμενη (ξηρά εδάφη) το DUAL GOLD 96 EC συνιστάται να συνδυάζεται με COTORAN 90 WG.
2. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο: μία(1).
3. Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να επακοουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή.
4. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαρεία εδάφη.
5. Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλήλ μόνο σε τομάτες μεταφυτευόμενες.
6. Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.
7. Η εφαρμογή του DUAL GOLD 96 EC δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την εκπύση της δραστητικής ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπογεία ύδατα (δηλαδή σε αμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση) αλλήλ και για την αποφυγή φυτοτοξικότητας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστάμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ορίγων ωρών.

Συνδυαστικότητα: Στην πατάτα (προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) του DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το SENCOR 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 90 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 50 SC στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται κυρίως από το στελέχος και το κολεότυλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυτάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός, ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρ. ανά στρ.

Αριθμ. παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη



TM